

Unidad Facial Contouring  
Dr. Joel Joshi Otero



# Consentimiento Informado

## Implantes faciales

---

## **INSTRUCCIONES**

Este consentimiento informado que ha sido preparado para ayudarlo a informarle sobre la cirugía de implante facial, sus riesgos, así como tratamientos alternativos.

Es importante que lea esta información cuidadosa y completamente. **Coloque sus iniciales en cada página**, indicando que ha leído la página, y firme el consentimiento para la cirugía según lo propuesto por su cirujano maxilofacial, el Dr. Joshi Otero.

Los implantes faciales son materiales sólidos, especialmente biocompatibles, diseñados para mejorar o aumentar la estructura física de su cara. La determinación del tipo y tamaño exactos de implantes más adecuados para usted requiere una evaluación de sus objetivos, las características que desea corregir y el criterio de su cirujano. Si bien cualquier área de la cara se puede aumentar con implantes, los pómulos, la barbilla y la mandíbula son los sitios más comunes para los implantes faciales. Los implantes faciales pueden aportar armonía y una mejor proporción a la apariencia estructural de la cara, y pueden ayudar a mejorar la proyección facial. La cirugía de implante facial se realiza mejor en personas cuya cabeza y cráneo han alcanzado la madurez física, lo que generalmente ocurre al final de la adolescencia. Es importante recordar que el rostro humano normalmente es asimétrico hasta cierto punto y sus resultados serán simétricos. La cirugía de implante facial se puede realizar sola o como complemento de otros procedimientos de contorno facial, como la cirugía ortognática, la rinoplastia u otoplastia.

### **TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS**

Las formas alternativas de tratamiento consisten en no someterse a la cirugía de implante facial. Existen alternativas a los implantes faciales, como rellenos, injertos de grasa autóloga o lipofilling.

### **RIESGOS INHERENTES DE LA CIRUGÍA DE IMPLANTES FACIALES**

Cada procedimiento quirúrgico implica una cierta cantidad de riesgo, y es importante que comprenda estos riesgos y las posibles complicaciones asociadas con ellos. Además, cada procedimiento tiene limitaciones. La elección de un individuo de someterse a un procedimiento quirúrgico se basa en la comparación de los riesgos con los posibles beneficios. Aunque la mayoría de los pacientes no experimentan estas complicaciones, debe analizar cada una de ellas con su cirujano maxilofacial para asegurarse de comprender todas las posibles consecuencias de la cirugía de implante facial.

### **RIESGOS ESPECÍFICOS DE LA CIRUGÍA DE IMPLANTES FACIALES**

#### **Asimetría:**

El rostro humano es normalmente asimétrico. Puede haber variaciones de un lado de la cara al otro en los resultados obtenidos de un implante facial.

#### **Extrusión de implante:**

La falta de cobertura adecuada de tejido o infección puede provocar la exposición y extrusión del implante. Si se produce una ruptura del tejido y el implante queda expuesto, puede ser necesario retirarlo.

#### **Lesión nerviosa:**

Los nervios motores y sensoriales pueden lesionarse durante una operación de implante facial. La debilidad o pérdida de movimientos faciales resulta en una apariencia desigual. La mayoría de las personas notarán una normalización de la función motora; La debilidad permanente es rara. También pueden ocurrir lesiones en los nervios sensoriales de las regiones de la cara, el cuello y el oído. El entumecimiento permanente o la cicatrización dolorosa son raros, pero pueden ocurrir.

#### **Daño a estructuras más profundas:**

Estructuras más profundas como los ojos, nervios, huesos faciales, vasos sanguíneos y músculos pueden afectarse durante el curso de la cirugía. La posibilidad de que esto ocurra varía según el tipo de procedimiento de implante facial realizado. La lesión a estructuras más profundas puede ser temporal o permanente.

#### **Dolor crónico:**

Muy raramente, puede ocurrir dolor crónico después de la cirugía de implante facial.

#### **Perdida de cabello:**

La pérdida de cabello puede ocurrir en áreas de la cara donde la piel se ha elevado durante la cirugía. La ocurrencia de esto no es predecible.

#### Sangrado:

Es posible, aunque inusual, que tenga problemas de sangrado durante o después de la cirugía. Si se produce un sangrado postoperatorio, puede requerir un tratamiento de emergencia para detener el sangrado o eliminar la sangre acumulada (hematoma). No tome aspirina o medicamentos antiinflamatorios durante diez días antes de la cirugía, ya que esto contribuye a un mayor riesgo de sangrado. Las "hierbas" sin receta y los suplementos dietéticos pueden aumentar el riesgo de hemorragia quirúrgica. La hipertensión (presión arterial alta) que no está bajo un buen control médico puede causar sangrado durante o después de la cirugía. Las acumulaciones de sangre debajo de la piel pueden retrasar la curación y causar cicatrices.

#### Cicatrices:

Aunque se espera una buena cicatrización de la herida después de un procedimiento quirúrgico, pueden aparecer cicatrices anormales tanto en la piel como en los tejidos más profundos. Las cicatrices pueden ser poco atractivas y de diferente color que la piel circundante. Existe la posibilidad de marcas visibles de suturas. Es posible que se necesiten tratamientos adicionales, incluida la cirugía, para tratar las cicatrices.

#### Resultado insatisfactorio:

Existe la posibilidad de un resultado insatisfactorio de la cirugía de implante facial. La cirugía puede provocar deformidades visibles o táctiles inaceptables, pérdida de función o malposición estructural. Puede decepcionarse que los resultados de la cirugía de implante facial no cumplan con sus expectativas. Segundas cirugías pueden ser necesarias si el resultado de la cirugía de implante facial no es satisfactorio. La curación parcial de las estructuras dañadas antes de la colocación de los implantes faciales puede interferir con el resultado óptimo de la cirugía.

#### Cirugía adicional necesaria:

En caso de complicaciones, puede ser necesaria una cirugía adicional u otros tratamientos. Existen muchas condiciones variables y posibles complicaciones quirúrgicas que pueden influir en el resultado a largo plazo de la cirugía de implante facial. Aunque los riesgos y complicaciones ocurren con poca frecuencia, los riesgos citados están particularmente asociados con la cirugía de implante facial. Pueden ocurrir otras complicaciones y riesgos, pero son aún más infrecuentes. No existe garantía, expresa o implícita, en cuanto a los resultados que se pueden obtener.

### RIESGOS GENERALES DE CIRUGÍA

#### Problemas de curación:

Ciertas condiciones médicas, suplementos dietéticos y medicamentos pueden retrasar e interferir con la curación. Los pacientes con pérdida de peso masiva también pueden tener un retraso en la curación.

Además, la infección y los cambios en los tejidos dan como resultado la necesidad de atención médica adicional, cirugía y hospitalizaciones prolongadas. Los pacientes con diabetes o aquellos que toman medicamentos como los esteroides de manera prolongada pueden tener problemas de curación prolongados. Fumar causará un retraso en el proceso de curación, lo que a menudo resulta en la necesidad de una cirugía adicional. Existen riesgos generales asociados con la curación, como hinchazón, sangrado, posibilidad de cirugía adicional, recuperación prolongada, cambios de color, cambios de forma, infección, no cumplir con las metas y expectativas del paciente, y gastos adicionales para el paciente. También puede haber una recuperación más larga debido a la duración de la cirugía y la anestesia. Los pacientes con una laxitud significativa de la piel (pacientes que buscan liftings faciales, o liposucciones cervicales) continuarán teniendo la misma piel laxa después de la cirugía. La calidad o elasticidad de la piel no cambiará significativamente.

#### Sangrado:

Es posible, aunque inusual, experimentar un episodio de sangrado durante o después de la cirugía. Si se produce un sangrado postoperatorio, puede requerir tratamiento para drenar el hematoma. El aumento de la actividad física demasiado pronto después de la cirugía puede conducir a una mayor probabilidad de sangrado. Es importante seguir las instrucciones postoperatorias y limitar el ejercicio y la actividad extenuante durante el tiempo indicado. Las "hierbas medicinales" sin receta y los suplementos dietéticos pueden aumentar el riesgo de hemorragia quirúrgica. Los hematomas pueden ocurrir en cualquier momento, generalmente en las primeras tres semanas después de la lesión en el área operatoria.

#### Infección:

La infección, aunque es poco frecuente, puede ocurrir después de la cirugía. Si se produce una infección, puede ser necesario un tratamiento adicional que incluya antibióticos, hospitalización o cirugía adicional. Es importante informarle a su cirujano sobre cualquier otra infección, como antecedentes de infecciones por *Staphylococcus aureus* resistente a la metilicina (MRSA), una herida no cicatrizada, o infección respiratoria reciente.

#### Íleo paralítico:

El retorno de la función intestinal después de la cirugía es importante. Un íleo paralítico es una interrupción en la función intestinal causada por la falla del peristaltismo o por la hipo movilidad de sus intestinos que resulta en una falta de defecación y posiblemente vómitos repetidos. Los anestésicos y medicamentos como los analgésicos que se le administran en el momento de la cirugía pueden contribuir al desarrollo de esta complicación en el postoperatorio. Puede provocar distensión abdominal, vómitos, incapacidad para absorber medicamentos orales y posiblemente hospitalización.

#### Cicatrices:

Todas las cirugías dejan cicatrices, algunas más visibles que otras. Aunque se espera una buena cicatrización de la herida después de un procedimiento quirúrgico, esta cirugía dará como resultado cicatrices intra o extraorales que son permanentes. Existe la posibilidad de marcas visibles en la piel por suturas. Estas cicatrices pueden elevarse, enrojecerse o decolorarse en las primeras semanas / meses, pero generalmente se establecen con el tiempo. Sin embargo, algunos pacientes son propensos a las cicatrices "hipertroficas" o "queloides", que son cicatrices prominentes, elevadas y rojas que no se asientan. Se pueden requerir tratamientos adicionales con medicamentos y / o cirugía.

#### Sensibilidad de la piel:

La picazón, la sensibilidad o las respuestas exageradas a temperaturas altas o bajas pueden ocurrir después de la cirugía. Por lo general, esto se resuelve durante la curación, pero en situaciones raras, puede ser crónica.

#### Dehiscencia de las heridas:

Las heridas pueden separarse después de la cirugía. Si esto ocurre, puede ser necesario un tratamiento adicional que incluya cirugía.

#### Suturas:

La mayoría de las técnicas quirúrgicas utilizan suturas profundas. Puede notar estas suturas después de su cirugía. Las suturas pueden penetrar espontáneamente a través de la piel, hacerse visibles o producir irritación que requiere la extracción de la misma.

#### Resultado insatisfactorio:

Aunque se esperan buenos resultados, no hay garantía, expresa o implícita, sobre los resultados que se pueden obtener. El cuerpo no es simétrico y casi todos tienen algún grado de desnivel, que puede no ser reconocido de antemano. Un lado de la cara puede ser un poco más grande, mientras que un lado de la cara puede estar más caído. Muchos de estos problemas no se pueden corregir por completo con la cirugía. Cuanto más realistas sean sus expectativas en cuanto a resultados, mejores serán sus resultados. Algunos pacientes nunca logran sus objetivos o resultados deseados, sin culpa del cirujano o la cirugía. Puede estar decepcionado con los resultados de la cirugía. La asimetría, la forma y el tamaño imprevistos, la pérdida de la función, la interrupción de la herida, la cicatrización deficiente y la pérdida de la sensibilidad pueden ocurrir después de la cirugía. El tamaño puede ser incorrecto. La ubicación o apariencia de cicatriz quirúrgica no satisfactoria puede ocurrir. Puede ser necesario realizar una cirugía adicional para mejorar sus resultados. Los resultados insatisfactorios NO pueden mejorar con cada tratamiento adicional.

## AVISOS ADICIONALES

#### Medicamentos y suplementos dietéticos a base de hierbas:

Hay posibles reacciones adversas que ocurren como resultado de tomar medicamentos de venta libre, herbales y / o recetados. La aspirina y los medicamentos que contienen aspirina interfieren con la formación de coágulos sanguíneos y, por lo tanto, pueden contribuir a más problemas de sangrado. Si tiene una afección médica (como arritmia cardíaca, stent cardíaco, vasos sanguíneos con bloqueos o coágulos sanguíneos) y está tomando medicamentos para diluir su sangre y evitar la coagulación, como Plavix®, Xarelto®, Coumadin®, Effient® o Pradaxa®, discuta el manejo de estos medicamentos en el momento de la cirugía con su cirujano maxilofacial. Se puede coordinar un plan para estos medicamentos con el médico que los recetó para su afección médica. Si le recetaron medicamentos para una afección médica, no los detenga sin hablar primero con su cirujano maxilofacial. Suspender estos medicamentos abruptamente puede provocar un problema cardíaco, un derrame cerebral o la muerte. Asegúrese de consultar con su médico sobre cualquier interacción de medicamentos que pueda existir con medicamentos que ya está tomando. Si tiene una reacción adversa, suspenda los medicamentos inmediatamente y llame a su médico para obtener más instrucciones. Si la reacción es severa, vaya inmediatamente a la sala de emergencias más cercana.

Cuando tome los analgésicos recetados después de la cirugía, tenga en cuenta que pueden afectar su

proceso de pensamiento y coordinación. No conduzca, no opere equipos complejos, no tome decisiones importantes y no beba alcohol mientras esté tomando estos medicamentos. Asegúrese de tomar su medicamento recetado solo según las indicaciones.

#### Planes de viaje:

Cualquier cirugía conlleva el riesgo de complicaciones que pueden retrasar la curación y su regreso a la vida normal. Informe al cirujano sobre cualquier plan de viaje, compromisos importantes ya programados o planificados, o demandas de tiempo que sean importantes para usted, para que pueda ocurrir el momento adecuado de la cirugía. No hay garantías de que pueda reanudar todas las actividades en el plazo deseado. Permita al menos 10–14 días para viajar por vía aérea. Es posible que se requieran medicamentos si tiene un vuelo / viaje largo para prevenir la trombosis venosa profunda (TVP) / embolia pulmonar (EP) en el período postoperatorio inmediato.

#### Resultados a largo plazo:

Las alteraciones posteriores en la apariencia de su cuerpo pueden ocurrir como resultado del envejecimiento, la exposición al sol, la pérdida de peso, el aumento de peso, el embarazo, la menopausia u otras circunstancias no relacionadas con su cirugía.

#### Perforación del cuerpo:

A las personas que actualmente usan joyas que perforan el cuerpo en la región quirúrgica se les informa que podría desarrollarse una infección a partir de esta actividad. Las joyas que perforan el cuerpo deben quitarse antes de su procedimiento quirúrgico.

#### Uñas:

Para determinar sus signos vitales durante la cirugía, su anestesista va a requerir acceso a sus uñas para el monitoreo. Asegúrese de tener al menos dos uñas libres de esmalte de uñas o uñas acrílicas en la fecha de la cirugía.

#### Joyería:

No se deben traer joyas al momento de su procedimiento quirúrgico. Los artículos como aretes, anillos de boda y collares deben retirarse y colocarse en un lugar seguro.

#### Relaciones íntimas después de la cirugía:

La cirugía implica la coagulación de los vasos sanguíneos y una mayor actividad de cualquier tipo puede abrir estos vasos y provocar una hemorragia o un hematoma. La actividad que aumenta su pulso o frecuencia cardíaca puede causar moretones adicionales, hinchazón y la necesidad de regresar a la cirugía para controlar el sangrado. Es aconsejable abstenerse de realizar actividades físicas íntimas hasta que su médico indique que es seguro.

#### CIRUGÍA ADICIONAL NECESARIA (Reoperaciones)

Hay muchas condiciones variables que pueden influir en el resultado a largo plazo de la cirugía. No se sabe cómo responderá su tejido o cómo se producirá la cicatrización de la herida después de la cirugía. La cirugía secundaria puede ser necesaria para realizar un ajuste o reposicionamiento adicional de las estructuras corporales. En caso de complicaciones, puede ser necesaria una cirugía adicional u otros tratamientos. Aunque los riesgos y complicaciones ocurren con poca frecuencia, los riesgos citados están asociados con esta cirugía. Pueden ocurrir otras complicaciones y riesgos, pero son menos comunes. La práctica de la medicina y la cirugía no es una ciencia exacta. Aunque se esperan buenos resultados, no hay garantía, expresa o implícita, sobre los resultados que se pueden obtener. En algunas situaciones, puede que no sea posible lograr resultados óptimos con un solo procedimiento quirúrgico. Usted y su cirujano discutirán las opciones disponibles en caso de que se recomiende una cirugía adicional. Puede haber costos y gastos adicionales para dichos procedimientos adicionales, que incluyen tarifas quirúrgicas, tarifas de instalaciones y anestesia, y tarifas de patología y pruebas de laboratorio.

#### TABACO

Los pacientes que fuman o usan tabaco o productos de nicotina (parche, chicle o aerosol nasal) tienen un mayor riesgo de complicaciones quirúrgicas significativas, como pérdida de piel, cicatrización tardía y cicatrización adicional. Los fumadores pasivos también tienen un riesgo potencial de complicaciones similares atribuibles a la exposición a la nicotina. Además, fumar puede tener un efecto negativo significativo sobre la anestesia y la recuperación de la anestesia, con tos y posiblemente aumento del sangrado. Las personas que no están expuestas al humo del tabaco ni a los productos que contienen nicotina tienen un riesgo significativamente menor de este tipo de complicaciones. Indique su estado

actual con respecto a estos elementos a continuación:

\_\_\_\_ No fumo y no uso productos de nicotina. Entiendo el riesgo potencial de exposición al humo de segunda mano que causa complicaciones quirúrgicas.

\_\_\_\_ Soy fumador o uso productos de tabaco / nicotina. Entiendo el riesgo de complicaciones quirúrgicas debido al tabaquismo o al uso de productos de nicotina.

\_\_\_\_ He fumado y me detuve hace aproximadamente. Entiendo que aún puedo tener los efectos y, por lo tanto, los riesgos de fumar en mi sistema, si no ha transcurrido el tiempo suficiente.

\_\_\_\_ Se me ha aconsejado que deje de fumar inmediatamente y se me ha informado sobre los riesgos, beneficios, expectativas y alternativas a mi cirugía si sigo fumando.

Es importante abstenerse de fumar al menos 6 semanas antes de la cirugía y hasta que su médico indique que es seguro regresar, si lo desea. Reconozco que informaré a mi médico si sigo fumando dentro de este plazo, y entiendo que, por mi seguridad, la cirugía, si es posible, puede retrasarse.

**Es importante que lea detenidamente la información anterior y responda a todas sus preguntas antes de firmar el consentimiento en la página siguiente.**

### **Consentimiento informado - Implantes faciales**

#### **CONSENTIMIENTO PARA CIRUGÍA / PROCEDIMIENTO o TRATAMIENTO**

1. Por la presente autorizo al Dr. Joel Joshi Otero y a los asistentes que puedan ser seleccionados para realizar la **Cirugía de implante facial**.

He recibido la siguiente hoja de información: Cirugía de implante facial.

2. Reconozco que durante el curso de la operación y el tratamiento médico o la anestesia, las condiciones imprevistas pueden requerir procedimientos diferentes a los anteriores. Por lo tanto, autorizo al médico y asistentes o personas designadas anteriormente a realizar otros procedimientos que sean necesarios y deseables en el ejercicio de su criterio profesional. La autoridad otorgada bajo este párrafo incluirá todas las condiciones que requieren tratamiento y que mi médico desconoce en el momento en que se inicia el procedimiento.

3. Doy mi consentimiento para la administración de los anestésicos que se consideren necesarios o recomendables. Entiendo que todas las formas de anestesia implican riesgos y la posibilidad de complicaciones.

4. Entiendo lo que mi cirujano puede y no puede hacer, y entiendo que aquí no hay garantías ni garantías, implícitas o específicas, sobre mi resultado. He tenido la oportunidad de explicar mis objetivos y comprender qué resultados deseados son realistas y cuáles no. Todas mis preguntas han sido respondidas, y entiendo los riesgos inherentes (específicos) a los procedimientos que busco, así como los riesgos y complicaciones adicionales, los beneficios y las alternativas. Entendiendo todo esto, elijo proceder.

5. Doy mi consentimiento para ser fotografiado o televisado antes, durante y después de la (s) operación (es) o procedimiento (s) a realizar, incluidas las partes apropiadas de mi cuerpo, con fines médicos, científicos o educativos, siempre que mi identidad no sea revelado por las fotos.

6. Con el fin de avanzar en la educación médica, doy mi consentimiento para la admisión de observadores en la sala de operaciones.

7. Soy consciente de que existen riesgos potenciales importantes para mi salud con el uso de productos sanguíneos, y doy mi consentimiento para su uso si mi cirujano y / o sus nombrados los consideran necesarios.

9. Entiendo que los honorarios de los cirujanos están separados de los cargos por anestesia y hospital, y los honorarios son aceptables para mí. Si es necesario un procedimiento secundario, se requerirán más gastos.

10. Me doy cuenta de que no tener la operación es una opción. Opto por realizarme este procedimiento.

11. Me ha sido explicado de una manera que entiendo:

a. EL PROCEDIMIENTO MENCIONADO SE REALIZARÁ.

b. EXISTEN PROCEDIMIENTOS ALTERNATIVOS O MÉTODOS DE TRATAMIENTO

c. HAY RIESGOS PARA EL PROCEDIMIENTO O TRATAMIENTO PROPUESTO

Nombre del Paciente

Fecha

DNI